

## デルティバ錠 50mg

### 【この薬は？】

販売名	デルティバ錠 50mg DELTIBA tablets 50mg
一般名	デラマニド Delamanid
含有量（1錠中）	デラマニド 50mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、結核化学療法剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、結核菌に作用してその増殖を阻害します。
- ・次の病気の人に処方されます。

#### 〈適応症〉

#### 多剤耐性肺結核

#### 〈適応菌種〉

#### 本剤に感性の結核菌

- ・他の抗結核薬と併用されます。
- ・この抗菌薬は自己判断で飲むのを止めたり、飲む量を減らしたりしないでください。指示通りにきちんと飲まない、治療効果が低下するばかりでなく、原因菌がこの薬の効かない菌に変化したり、他の抗菌薬も効かなくなったりする可能性があります。医師の指示通りに飲むことが大切です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- QT 延長（動悸（どうき）、気を失う）があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合は、ただちに受診してください。この薬の使用前や使用中に定期的に心電図検査、血液検査などが行われます。
- 適格性確認システム\*に登録されます。  
\*耐性菌発現を防ぐための確認システムです。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にデルティバ錠に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
  - ・妊婦または妊娠している可能性がある人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
  - ・QT 延長のある人
  - ・著明な徐脈のある人
  - ・電解質異常のある人（低カリウム血症，低マグネシウム血症，低カルシウム血症）
  - ・心臓に障害のある人
  - ・QT 延長を起こすことが知られている薬を使用している人
  - ・肝臓に障害のある人
  - ・低アルブミン血症のある人
  - ・高齢の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

通常、成人の飲む量は1回2錠を1日2回、朝食後と夕食後に分けて飲みます。空腹時に飲むと薬の血液中の濃度が通常より下がるため、空腹時に飲むことは避けてください。

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

飲み忘れた場合は、気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

QT 延長（動悸（どうき）、気を失う）があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合は、使用を中止し、ただちに受診してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬の使用時に、QT 延長（動悸（どうき）、気を失う）があらわれることがあるため、これらの症状があらわれた場合は、ただちに受診してください。心電図検査、血液検査などが定期的に行われます。

- ・授乳中の方は、授乳を避けてください。

## 副作用は？

特にご注意ください。重大な副作用と主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、重大な副作用に記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。



このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
QT 延長 キューティーエンちょう	動悸（どうき）、気を失う

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

部位	自覚症状
胸部	動悸（どうき）
その他	気を失う

## 【この薬の形は？】

販売名	デルティバ錠 50mg
PTP シート	
形状	帯褐黄色の錠剤 
直径	11.7mm
厚さ	5.3mm
重さ	536mg

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	デラマニド 50mg
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、デンプン、グリコール酸ナトリウム、カルメロースカルシウム、ヒプロメロースフタル酸エステル、軽質無水ケイ酸、ポビドン、トコフェロール、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、タルク、黄

	色三二酸化鉄
--	--------

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・吸湿性があるのでPTP包装から出さないで保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社 大塚製薬株式会社 (<http://www.otsuka.co.jp>)

医薬情報センター

電話番号：0120-922-833

受付時間：月～金 9：00～17：00

（土、日、祝日、休業日を除く）