

ยาสำหรับโรคผิวหนังและการรักษาบาดแผลภายนอก

第2類医薬品

Oronine H Ointment

กรุณาดูเบา ๆ โดยใช้เพียง
ปริมาณเล็กน้อยลงบน
ผิวและแผลตุ่มหนอง
กรุณาเช็ดออกด้วยผ้าขนหนู
ผ้าก๊อช เป็นต้นหาก
เหนียวติดมือ

บาดแผล (แผลจากการถูก
บาดแผลลอกและแผล
จากการเฉี่ยวชน)
กรุณาเช็ดทำความสะอาด
บริเวณที่เป็นแผลแล้วจึงทา
Oronine H Ointment
ฆ่าเชื้อบริเวณปากแผล
และป้องกันการเกิดหนอง

แผลน้ำร้อนลวกชนิดเบา
กรุณาทาลงบนบริเวณ
ที่เป็นแผล
แล้วปิดด้วยผ้าก๊อช
ป้องกันการเกิดหนอง

กรุณาใช้กับบาดแผล
ที่เกิดจากการบาดของมีด
ใบมีด โกงเป็นต้น
ป้องกันการเกิดหนอง
จากการใช้
งานที่เอามาเช็ด ไรศของ
Oronine H Ointment



ทาบริเวณที่ถูกน้ำกัดทำ
หลังจากอาบน้ำเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพดี ระวังอย่าลืมและ
กรุณาใช้อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกวัน อนึ่ง
ไม่เหมาะสำหรับแผลน้ำกัด
เก่าที่มีสภาพความอับชื้นและ
เกิดหนองไหลออกมา

กรุณาใช้ Oronine H
Ointment กับหิด
โรคผิวหนังจากเชื้อรา
แผลชันษาคุดและผิวหนัง
ลอกเป็นขุย

ไม่ว่าใครก็คงมีประสบการณ์ที่
เกิดจากการริบร้อนจนได้
บาดแผลที่นี้ก็ไม่ถึง
บริเวณภูเขาและทะเลมาก่อน
Oronine H Ointment
ไม่ได้เป็นเพียงแค่สามัญ
ประจำบ้านเท่านั้นแต่ยัง
สามารถใช้เป็นยาพกพา
สำหรับออกไปข้างนอกและ
การท่องเที่ยวได้ด้วย

ผิวหนังที่ดูดูหนา
แผลหิดและ
มือเท้าแตก
กรุณาทาก่อนเข้าอน
หลังจากอาบน้ำและ
เสร็จสิ้นงานบ้าน
ที่เกี่ยวข้องกับน้ำแล้ว



ข้อควรระวังในการใช้

สิ่งที่ไม่ควรทำ
(กรุณาอย่าใช้กับบริเวณดังต่อไปนี้ (อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ง่ายขึ้นและทำให้อาการบึงจูนแย่ลงหากไม่ปฏิบัติตาม)

- อาการคันแดงและบวม (คันลมพิษ ผิวหนังอักเสบ) (2) บริเวณที่มีการรองพื้นเครื่องสำอาง (3) เมล่งกััดค้อย

ควรปรึกษา

- บุคคลดังต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาผู้จำหน่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือแพทย์ เกลัชกรก่อนการใช้งาน
(1) ผู้ที่อยู่ในการรักษาของแพทย์ (2) ผู้ที่เกิดอาการแพ้จากยา (เช่น ผดผื่นตามผิวหนัง คันแดง อาการคัน การบวม เป็นต้น)
(3) ผู้ที่มีบริเวณที่เป็นแผลร้าว (4) ผู้ที่มีสภาพไวต่อความชื้นและเกิดคันลมพิษได้ง่าย (5) ผู้ที่มีแผลหรือแผลลวกรุนแรงและบาดแผลลึก
2. หลังการใช้งานหากมีอาการต่อไปนี้เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดผลข้างเคียง กรุณาหยุดใช้งานทันที และนำเอกสารแนบนี้ปรึกษาแพทย์
เกลัชกรหรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

Table with 2 columns: ส่วนที่เกี่ยวข้อง, อาการป่วย. Row 1: ผิวหนัง, การเกิดผดผื่นและคันแดง คัน บวม แห้งและแห้งแตก

กรณีมีอาการไม่ดีขึ้นแม้ว่าใช้เป็นเวลา 5-6 วันแล้วก็ตาม ควรหยุดใช้ทันที และกรุณานำเอกสารแนบนี้ปรึกษาแพทย์
เกลัชกรหรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ

ผิว แผลตุ่มหนอง ผิวหนังลอกเป็นขุย น้ำร้อนลวก (อย่างเบา) แผลแห้งแตก แผลหิมะกัด มือเท้าแตก บาดแผล น้ำกัดเท้า (ชนิดที่ไม่มีหนองไหลออกมา)
โรคผิวหนังจากเชื้อรา หิด และแผลชันษาคุด

วิธีใช้งานและปริมาณที่เหมาะสม

ใช้กับบาดแผลโดยตรงโดยใช้นิ้วมือที่ล้างสะอาดหรือใช้ปิ๋ยคั้วยผ้าก๊อชหรือสำลีตามสภาพของบริเวณที่เป็นแผล
《ข้อควรระวังเกี่ยวกับวิธีใช้งานและปริมาณที่เหมาะสม》

- (1) กรณีที่ใช้ในเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การควบคุมชี้แนะของผู้ปกครอง
(2) กรุณาพึงระวังอย่าให้เข้าตากรณีที่ใช้ตากรุณาล้างออกด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำสะอาดทันที อนึ่ง กรณีที่มีอาการรุนแรง กรุณาเข้ารับการรักษาจากจักษุแพทย์
(3) กรุณาใช้ยานี้สำหรับการใช้ภายนอกเท่านั้น
(4) กรุณาใช้หลังจากทำความสะอาดสิ่งสกปรก โดยรอบและบริเวณบาดแผลแล้ว

ส่วนผสม

ยานี้เป็นขี้ผึ้งชนิดที่สามารถละลายน้ำได้ซึ่งมีส่วนผสม Chlorhexidine gluconate ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ ในปริมาณ 1 กรัมจะมีส่วนผสมของ
Chlorhexidine gluconate (20%) อยู่ 10 มิลลิกรัม อนึ่ง ยังมี Lauromacrogol, Polysorbate 80, Sulfuric Acid AlK, Macro Goal, Glycerin, Olive Oil, Stearyl
alcohol, Beeswax Vaseline, self emulsifying type glycerol stearate, fragrance, purified water เป็นต้นสารประกอบเพิ่มเติม

ข้อควรระวังในการเก็บรักษาและการดูแล

- (1) กรุณาจัดเก็บโดยปิดฝาให้สนิทวางไว้ในที่เย็น ไม่โดนแสงแดดโดยตรง
(2) กรุณาจัดเก็บไว้ในที่ที่เด็กเอื้อมมือหยิบไม่ถึง
(3) กรุณาอย่าสัมผัสได้กับภาชนะบรรจุอื่น (การใช้งานผิดอาจเป็นสาเหตุทำให้คุณภาพเกิดการเปลี่ยนแปลง)
(4) กรุณาอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดการใช้งานตามที่ระบุบนภาชนะบรรจุและกล่องด้านนอก
(5) กรุณาหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการขนถ่ายอย่างรุนแรงเนื่องจากภาชนะบรรจุท่วมมาจากแก้ว อาจทำให้ภาชนะแตกและเกิดบาดแผลได้

การบรรจุ

ชนิดหลอด 11 กรัม ชนิดขวดแก้ว 30 กรัม 100 กรัม 250 กรัมและ 500 กรัม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยานี้ กรุณาติดต่อสอบถาม ณ ร้านค้าที่ท่านซื้อหรือสถานที่อยู่ทั่วประเทศ

สถานที่ติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไอทีเค ฟาร์มาซูติคอลล จำกัด

2-9 ถนนเดลีสาละ เขตจตุโศค กรุงเทพฯ 101-8535 หมายเลขโทรศัพท์ (03)3293-3212 เวลาสอบถาม 9:00 - 17:00 (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สถานที่ติดต่อสอบถามระบบการให้ความช่วยเหลือจาก
ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ของไอซีเอ
(หน่วยงานอิสระ) สำนักงานบริการลูกค้าทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
โทร. 0120-149-931(หมายเลขโทรฟรี)
ระบบการให้ความช่วยเหลือจากความเสียหายของผลิตภัณฑ์ของไอซีเอและเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์
(แผนกที่ให้บริการ) โรซายา และผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ไอซีเอ (รวมถึงผลิตภัณฑ์)
เป็นระบบของเภสัชภัณฑ์ที่ดำเนินการโดยไอซีเอ (รวมถึงผลิตภัณฑ์)
ให้แก่มูลนิธิสุขภาพจิตและความเสียหาย เช่น
ลักษณะและอาการที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้อบกพร่องอาจถูกพิจารณาจากการวินิจฉัยและวินิจฉัย
จากการใช้โดยไม่มีผลการใช้ยาอย่างถูกต้อง