

# 患者向医薬品ガイド

2022年2月更新

## モイゼルト軟膏 0.3% モイゼルト軟膏 1%

### 【この薬は？】

販売名	モイゼルト軟膏 0.3% Moizerto ointment 0.3%	モイゼルト軟膏 1 % Moizerto ointment 1%
一般名		ジファミラスト Difamilast
含有量	3mg (1g中)	10mg (1g中)

### 患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知りたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- この薬は、アトピー性皮膚炎治療剤と呼ばれるグループに属する塗り薬です。
- この薬は、ホスホジエステラーゼ4（PDE4）の活性を阻害し、細胞で炎症および抗炎症に関与する物質の発現を調節することにより、皮膚の炎症を抑えてアトピー性皮膚炎の症状を改善します。
- 次の病気の人処方されます。

#### アトピー性皮膚炎

- この薬は、体調が良くなつたと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると本来の効果が得られないことがあります。指示通りに使用することが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にモイゼルト軟膏に含まれる成分で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・皮膚感染症のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○妊娠する可能性がある人は、適切な避妊について説明を受けてください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

塗る量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、使用量および回数は次のとおりです。

販売名	モイゼルト軟膏 1 %	モイゼルト軟膏 0.3%
使用量	成人：適量を患部に塗ります。 小児：症状に応じて、適量を患部に塗ります。	小児：適量を患部に塗ります。
使用回数	1 日 2 回	

・塗る量は、皮疹の面積  $0.1\text{m}^2$ あたり 1 g を目安とします。

・軟膏をチューブから 2.5 cm (成人の人差し指の指先から第一関節まで) 押し出した量が、成人の手のひら 2 枚分の皮疹の面積に塗るために必要な量となります。

・モイゼルト軟膏 1 %を使用後、4 週間使用しても症状が改善しなかった場合には、主治医に相談してください。

### ●どのように使用するか？

・患部に塗る前によく手を洗い、塗り終わったらその指をきれいに洗ってください。

・粘膜、潰瘍（かいよう）、明らかに局面を形成しているびらんなどには塗らないでください。

・眼の周囲に塗る場合には眼に入らないように注意してください。（もし、眼に入った場合にはただちに水で洗い流してください。洗い流した後にも刺激感が持続する場合は、医療機関を受診してください。）

### ●塗り忘れた場合の対応

気が付いた時に、できるだけ早く 1 回分を塗ってください。ただし、次の使用時間が近い場合は、1 回とばして、次の時間に 1 回分を塗ってください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・妊娠する可能性がある人は、この薬を使用している間および使用終了から一定期間は妊娠しないように注意してください。
- ・授乳している人は、医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 【この薬の形は？】

販売名	モイゼルト軟膏 0.3%	モイゼルト軟膏 1 %
性状	白色の軟膏	白色の軟膏
内容量	10 g	10 g
容器の形状		

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	モイゼルト軟膏 0.3%	モイゼルト軟膏 1 %
有効成分	ジファミラスト	
添加剤	白色ワセリン、流動パラフィン、サラシミツロウ、パラフィン、炭酸プロピレン	

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・使用後はキャップをして保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社 大塚製薬株式会社 (<https://www.otsuka.co.jp>)

医薬情報センター

電話番号：0120-922-833

受付時間：月～金 9:00～17:00

(土、日、祝日、休業日を除く)