

薬には病気を治したり、^{しやうじやう}症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなると自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や^{やくざいし}薬剤師に相談してください。

ムコスタ点眼液 UD2%

一般名： レバミピド (Rebamipide)

販売名	ムコスタ点眼液 UD2%
形状	

1.どんな薬

- この薬は、^{なみだ}涙の成分であるムチンの産生を^{そくしん}促進し、^{なみだ}涙の状態を安定させることで、^{かくけつまくじやうひ}角結膜上皮（目の粘膜）の障害を改善します。[ドライアイ^{ちりやうざい}治療剤（ムチン産生^{そくしんざい}促進剤）]

2.この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

- ⊗ 次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や^{やくざいし}薬剤師に相談してください。
 - ・過去にムコスタ点眼液に含まれる成分で^{かびんしやう}過敏症のあった人
- 次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や^{やくざいし}薬剤師に相談してください。
 - ・妊婦または^{にんしん}妊娠している可能性がある人
 - ・授乳中の人
- 他の^{いりやうきかん}医療機関にかかる場合や、薬局などで他の薬を買う場合は、必ずこの薬を使用していることを医師や^{やくざいし}薬剤師に伝えてください。

3.この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

- この薬の使用により、以下のような^{しやうじやう}症状があらわれることがあります。これらの^{しやうじやう}症状に気づいたら、医師や^{やくざいし}薬剤師に相談してください。

主な ^{しやうじやう} 症状	考えられる副作用など
^{なみだ} 涙がこぼれ続ける	^{るいどうへいそく} 涙道閉塞
^{なみだ} 涙がこぼれ続ける、目やにが増える、目が何か変な感じがする、目の鼻側の角（目頭）のあたりが赤くはれる、目の鼻側の角（目頭）のあたりが痛い	^{るいのうえん} 涙嚢炎

- 自動車運転等：点眼後、一時的に目がかすむことがありますので、機械類の操作や自動車などの運転は注意してください。

4.ほかに知られている副作用

「3.この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと」に記載されている副作用のほか、^{ひかくてき}比較的よくみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの^{しやうじやう}症状や、^{ふだん}普段と異なる^{しやうじやう}症状に気づいたら、医師や^{やくざいし}薬剤師に相談してください。

主な ^{しやうじやう} 症状	考えられる副作用
口の中が苦味などの嫌な味がする、食べ物の味が変わった、食事がおいしくなくなった	苦味
目のかゆみ	^{がん} 眼 ^{そう} 痒

5. 保管方法

光と湿気^{しつげ}をさけて室温（1～30℃）で保管してください。薬剤が分散しにくくなりますので、点眼口を下向きにして保管しないでください。保存剤^{ほぞんざい}を含まない、1回使い捨ての薬なので、点眼後は薬が残っていても必ず捨ててください。

6. 問い合わせ先

症状^{しょうじょう}、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師^{やくざいし}におたずねください。

この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：大塚製薬株式会社 (<https://www.otsuka.co.jp>)

電話：0120-922-833（医薬情報センター）、受付時間：9時～17時（土、日、祝日、休業日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html>