

薬には病気を治したり、**症状**をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や**薬剤師**に相談してください。

ムコスタ錠 100mg

一般名： レバミピド (Rebamipide)

販売名	ムコスタ錠 100mg
形状	

1. どんな薬

- この薬は、**胃粘膜** プロスタグランジン E2 増加作用や **胃粘膜** 保護作用により **胃粘膜** 傷害を抑制し、**胃粘液** 量や **胃粘膜** 血流量の増加で血行動態の障害を改善し、**炎症**を抑え、**胃粘膜**を修復します。[胃炎・胃潰瘍 治療剤]

2. この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

- ⊗ 次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や**薬剤師**に相談してください。
 - ・過去にムコスタ錠に含まれる成分で**過敏症**のあった人
- 次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や**薬剤師**に相談してください。
 - ・妊婦 または 妊娠している可能性がある人
 - ・授乳中の人
- 他の**医療機関**にかかる場合や、薬局などで他の薬を買う場合は、必ずこの薬を使用していることを医師や**薬剤師**に伝えてください。

3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

4. ほかに知られている副作用

比較的よくみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの**症状**や、**普段**と異なる**症状**に気づいたら、医師や**薬剤師**に相談してください。

主な 症状	考えられる副作用
便が出にくい	便秘
お腹がパンパンになる感じがする	腹部膨満感
皮ふにできたできものや傷	発疹

5. 保管方法

直射日光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。

6. 問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や**薬剤師**におたずねください。

この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：大塚製薬株式会社 (<https://www.otsuka.co.jp>)

電話：0120-922-833（医薬情報センター）、受付時間：9時～17時（土、日、祝日、休業日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html>