

ユニフィル LA 錠 100mg ユニフィル LA 錠 200mg ユニフィル LA 錠 400mg

【この薬は？】

販売名	ユニフィル LA 錠 100mg UNIPHYL LA tablets 100mg	ユニフィル LA 錠 200mg UNIPHYL LA tablets 200mg	ユニフィル LA 錠 400mg UNIPHYL LA tablets 400mg
一般名	テオフィリン Theophylline		
含有量 (1 錠中)	100mg	200mg	400mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、キサンチン系気管支拡張剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、気管支の拡張、呼吸中枢の刺激などの作用により、気管支喘息、慢性気管支炎や肺気腫による咳や痰がからむ、息苦しさ等の諸症状を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。

気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減した

りすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にユニフィル LA 錠または他のキサンチン系薬剤で重篤な副作用を経験したことがある人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・てんかんの人
- ・甲状腺機能亢進症の人
- ・急性腎炎の人
- ・うっ血性心不全の人
- ・肝臓に障害のある人
- ・高齢の人
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人、授乳中の人
- ・小児

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	ユニフィル LA 錠 100mg	ユニフィル LA 錠 200mg	ユニフィル LA 錠 400mg
1 回量	4 錠	2 錠	1 錠
飲む回数	1 日 1 回	1 日 1 回	1 日 1 回

●どのように飲むか？

通常、夕食後に、コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯でかまずに飲んでください。
飲みにくい時は、割線で二つに割って飲んでください。(ユニフィル LA 錠 200mg、
ユニフィル LA 錠 400mg)

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。飲み忘れに気づいたらすぐに 1 回分を飲んでください。ただし、このお薬は効果が長く続くため、飲む間隔が短くなると副作用があらわれやすくなるおそれがありますので、とくに次の飲む時間が近い時は忘れた分を抜いて、次回から指示通りに飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

消化器症状（吐き気、嘔吐（おうと））、精神神経症状（頭痛、不眠、不安、興奮、けいれん、せん妄、意識障害、昏睡など）、心・血管症状（頻脈、不整脈、血圧

低下など)、低カリウム血症（息苦しい、脱力感、手足のまひ、口渇など）、呼吸促進、横紋筋融解症（筋肉痛、手足のしびれなど）の症状があらわれる可能性があります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれたらただちに使用を中止し、受診してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を使用中は、薬剤の血中濃度を定期的に測ることがあります。
- ・小児、特に乳幼児では発熱時に服用すると薬剤の血中濃度が上昇し、副作用があらわれやすくなるため、投与量の減量または投与の中止をする場合があります。お子様の状態を十分に観察し、発熱や異常が認められた場合には速やかに医師または薬剤師に相談してください。
- ・小児では一般に副作用であられる自覚症状を訴える能力が劣るので、保護者の方はお子様の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には速やかに医師に連絡してください。
- ・カフェインを多く含むコーヒーや紅茶などを多飲すると、副作用があらわれることがあります。
- ・たばこやセイヨウオトギリソウ（St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品が薬の効果に影響を与えることがあります。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合には、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
痙攣 けいれん	部分的または全身の筋肉がけいれんする
意識障害 いしきしょうがい	意識の低下、考えがまとまらない、判断力の低下
急性脳症 きゅうせいのうしょう	意識の低下、考えがまとまらない、判断力の低下、物忘れ
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	脱力感、手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ、筋肉の痛み、赤褐色尿
消化管出血 しょうかかんしゅっけつ	血を吐く、吐き気、嘔吐（おうと）、腹痛、血が混ざった便、黒色便
赤芽球癆 せきがきゅうろう	からだがだるい、めまい、息切れ、動悸（どうき）

重大な副作用	主な自覚症状
アナフィラキシー ショック	からだがだるい、ふらつき、意識の低下、考えがまとまらない、ほてり、顔面蒼白、眼と口唇のまわりのはれ、しゃがれ声、息苦しい、息切れ、動悸（どうき）、じんましん、判断力の低下
肝機能障害 かんきのうしょうがい	からだがだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐（おうと）、食欲不振、かゆみ、皮膚が黄色くなる、尿が黄色い
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿が褐色になる
頻呼吸 ひんこきゅう	呼吸が荒い、呼吸が速い
高血糖症 こうけつとうしょう	からだがだるい、脱力感

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	けいれん、脱力感、からだがだるい、ふらつき
頭部	意識の低下、考えがまとまらない、めまい
顔面	ほてり、顔面蒼白
眼	眼と口唇のまわりのはれ、白目が黄色くなる
口や喉	血を吐く、吐き気、嘔吐（おうと）、しゃがれ声、眼と口唇のまわりのはれ
胸部	吐き気、息切れ、動悸（どうき）、息苦しい、呼吸が荒い、呼吸が速い
腹部	吐き気、腹痛、食欲不振
手・足	手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ
皮膚	じんましん、かゆみ、皮膚が黄色くなる
筋肉	筋肉の痛み
便	血が混ざった便、黒色便
尿	赤褐色尿、尿が黄色い、尿が褐色になる
その他	判断力の低下、物忘れ

【この薬の形は？】

販売名	ユニフィル LA 錠 100mg	ユニフィル LA 錠 200mg	ユニフィル LA 錠 400mg
形状	  	  	  
直径	6.4mm	9.5mm	11.0mm
厚さ	2.9mm	2.8mm	4.1mm

色	白色	白色	白色
識別コード (錠剤に刻印されています)	PF U100	PF U200	PF U400
シート			

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ユニフィル LA 錠 100mg	ユニフィル LA 錠 200mg	ユニフィル LA 錠 400mg
有効成分	テオフィリン		
添加物	ヒドロキシエチルセルロース、ポビドン、セトステアリルアルコール、ステアリン酸マグネシウム、タルク		

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社 大塚製薬株式会社 (<http://www.otsuka.co.jp>)

医薬情報センター

電話番号：0120-922-833

受付時間：月～金 9：00～17：00

（土、日、祝日、休業日を除く）